

Q7 Covid-19 感染患者の担当はその他の患者の治療は避けた方が良いでしょうか？

Answer

感染リスクを最小限に留めるため、「COVID-19 が疑われる患者および／または陽性患者」を診療するチームと「COVID-19 に感染していない患者」を診療するチームを分けて組織化し、チーム間におけるスタッフの移動は最小限にする、または行わないことが推奨されています。

そのため、可能な限り「COVID-19 が疑われる患者および／または陽性患者」の担当セラピストは「COVID-19 に感染していない患者」の担当は避けることが推奨されます。

詳細資料

・ Jason Phua, et al. Intensive care management of coronavirus disease 2019 (COVID-19): challenges and recommendations. The Lancet Respiratory Medicine. 2020.

[https://doi.org/10.1015/S2213-2600\(20\)30161-2](https://doi.org/10.1015/S2213-2600(20)30161-2)

・ COVID-19:Practive based resorces Physiotherapy Management for COVID19 in the Acute Hospital Setting: Recommendations to guide clinical practice,Version 1.0,23

March 2020

<https://www.wcpt.org/covid19/practice>

【日本語版】

https://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/wcptnews/images/Japanese_Physiotherapy_Guideline_COVID-19_V1_translation.pdf